

CHAPITRE 4

Diagonalisation &  
trigonalisation

Hugo SALOU MPI\*

Dernière mise à jour le 21 janvier 2023

## Première partie

# Cours

## 1 (Ne pas) être diagonalisable

DÉFINITION 1:

Soit une matrice carrée  $A$ . On dit que  $A$  est *diagonalisable* s'il existe une matrice inversible  $P \in \text{GL}_n(\mathbb{K})$  telle que  $P^{-1} \cdot A \cdot P$  est diagonale.

EXERCICE 2: 1. Montrons que la matrice  $B = \begin{pmatrix} 7 & 1 \\ 0 & 7 \end{pmatrix}$  n'est pas diagonalisable. Par l'absurde : on suppose qu'il existe  $P \in \text{GL}_2(\mathbb{R})$  et  $(\lambda_1, \lambda_2) \in \mathbb{R}^2$  tels que

$$P^{-1} \cdot B \cdot P = \begin{bmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{bmatrix}.$$

On applique la trace  $\text{tr}$  et le déterminant  $\det$  :

$$\text{tr}(B) = \text{tr} \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{pmatrix} \quad \text{d'où} \quad \lambda_1 + \lambda_2 = 7 + 7 = 14 = \delta$$

$$\det(B) = \det \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{pmatrix} \quad \text{d'où} \quad \lambda_1 \times \lambda_2 = 7 \times 7 = 49 = p$$

D'où  $\lambda_1$  et  $\lambda_2$  sont des solutions de l'équation  $X^2 - \delta X + p = 0$ . Or

$$\begin{aligned} X^2 - \delta X + p = 0 &\iff X^2 - 14X + 49 = 0 \\ &\iff (X - 7)^2 = 0 \\ &\iff X = 7. \end{aligned}$$

D'où

$$B = P P^{-1} B P P^{-1} = P \begin{pmatrix} 7 & 0 \\ 0 & 7 \end{pmatrix} P^{-1} = P \cdot 7I_2 \cdot P^{-1} = 7I_2.$$

La matrice  $B$  n'est donc pas diagonalisable.

De même, montrons que la matrice  $A$  n'est pas diagonalisable. On remarque que

$$A \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 3 \\ 3 \end{pmatrix} = 3 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Ainsi,

$$P^{-1} \cdot A \cdot P = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & ? & 0 \\ 0 & 0 & ? \end{pmatrix} \quad \text{où} \quad P = \begin{pmatrix} 1 & ? & ? \\ 1 & ? & ? \\ 1 & ? & ? \end{pmatrix}.$$

De même,  $A \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = 1 \times \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ . D'où

$$P^{-1} \cdot A \cdot P = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & ? \end{pmatrix} \quad \text{où} \quad P = \begin{pmatrix} 1 & 1 & ? \\ 1 & 1 & ? \\ 1 & 0 & ? \end{pmatrix}.$$

Finalement, on en conclut que

$$P = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad P^{-1} \cdot A \cdot P = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} = D.$$

De plus, la matrice  $P$  est inversible car  $\det P \neq 0$ .

2. Pour calculer  $A^n$ , on pourrait chercher un polynôme annulateur  $Q$  de  $A$ , et on exprime  $X^n = Q \times T_n + R_n$ , et donc  $A^n = R_n(A)$ . Mais, on peut également diagonaliser  $A$  (si elle est diagonalisable). Ainsi,

$$D^n = (P^{-1} \cdot A \cdot P)^n = P^{-1} \cdot A \cdot \cancel{P} \cdot \cancel{P^{-1}} \cdot \dots \cdot \cancel{P} \cdot \cancel{P^{-1}} \cdot A \cdot P = P^{-1} \cdot A^n \cdot P.$$

D'où  $A^n = P \cdot D^n \cdot P^{-1}$ . Or,

$$D^n = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}^n = \begin{pmatrix} 3^n & 0 & 0 \\ 0 & 1^n & 0 \\ 0 & 0 & (-1)^n \end{pmatrix}.$$

On calcule donc  $A^n$  en calculant l'inverse de  $P$  :

$$A^n = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3^n & 0 & 0 \\ 0 & 1^n & 0 \\ 0 & 0 & (-1)^n \end{pmatrix} \cdot P^{-1}.$$

- 3.

$$\left. \begin{array}{l} u_{n+1} = v_n + 2w_n \\ v_{n+1} = u_n + 2w_n \\ w_{n+1} = 3w_n \end{array} \right\} \iff \begin{pmatrix} u_{n+1} \\ v_{n+1} \\ w_{n+1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_n \\ v_n \\ w_n \end{pmatrix}$$

$$\iff U_{n+1} = A \cdot U_n$$

$$\iff U'_{n+1} = D \cdot U'_n$$

où  $D = P^{-1} \cdot A \cdot P$ ,  $U'_{n+1} = P \cdot U_{n+1}$  et  $U'_n = P \cdot U_n$ .

$$\iff \begin{pmatrix} u'_{n+1} \\ v'_{n+1} \\ w'_{n+1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} u'_n \\ v'_n \\ w'_n \end{pmatrix}$$

$$\iff \begin{cases} u'_{n+1} = 3u'_n \\ v'_{n+1} = v'_n \\ w'_{n+1} = -w'_n \end{cases}$$

$$\iff \begin{cases} u'_n = K \times 3^n \\ v'_n = L \\ w'_n = M \times (-1)^n \end{cases}$$

Ainsi,

$$\begin{pmatrix} u_n \\ v_n \\ w_n \end{pmatrix} = \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}}_P \cdot \begin{pmatrix} K \times 3^n \\ L \\ M \times (-1)^n \end{pmatrix}.$$

D'où  $u_n = K \cdot 3^n + L + M \cdot (-1)^n$ ,  $v_n = K \times 3^n + L - M \cdot (-1)^n$  et  $w_n = K \cdot 3^n$ , où les constantes  $K$ ,  $L$  et  $M$  sont des constantes fixées par les conditions initiales.

- 4.

$$\left. \begin{array}{l} x'(t) = y(t) + 2z(t) \\ y'(t) = x(t) + 2z(t) \\ z'(t) = 3z(t) \end{array} \right\} \iff \begin{pmatrix} x'(t) \\ y'(t) \\ z'(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \\ z(t) \end{pmatrix}$$

$$\iff X'(t) = A \cdot X(t)$$

$$\iff U'(t) = D \cdot U(t) \text{ avec } D = P^{-1} \cdot A \cdot P \text{ et } X(t) = P \cdot U(t)$$

$$\iff \begin{pmatrix} u'(t) \\ v'(t) \\ w'(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} u(t) \\ v(t) \\ w(t) \end{pmatrix}$$

$$\iff \begin{cases} u'(t) = 3u(t) \\ v'(t) = v(t) \\ w'(t) = -w(t) \end{cases}$$

$$\iff \begin{cases} u(t) = K \cdot e^{3t} \\ v(t) = L \cdot e^t \\ w(t) = M \cdot e^{-t} \end{cases}$$

Ainsi

$$\begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \\ z(t) \end{pmatrix} = \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}}_P \cdot \begin{pmatrix} K \cdot e^{3t} \\ L \cdot e^t \\ M \cdot e^{-t} \end{pmatrix}.$$

D'où  $x(t) = K \cdot e^{3t} + L \cdot e^t + M \cdot e^{-t}$ ,  $y(t) = K \cdot e^{3t} + L \cdot e^t - M \cdot e^{-t}$  et  $z(t) = K \cdot e^{3t}$ .  
Les constantes  $K$ ,  $L$  et  $M$  peuvent être déterminées à partir des conditions initiales.

REMARQUE (équations différentielles):

On considère l'équation différentielle (\*) :  $x'(t) = \lambda \cdot x(t)$ . Les fonctions  $x : t \mapsto K \cdot e^{\lambda t}$  sont des solutions de cette équation. On peut utiliser la méthode de LAGRANGE : la méthode de la « variation de la constante. » On cherche des solutions sous la forme  $x(t) = k(t) \cdot e^{\lambda t}$  (vision du physicien). D'où  $k(t) = x(t)/e^{\lambda t}$  (vision du mathématicien). De plus,  $x'(t) = k'(t)e^{\lambda t} + k(t)\lambda e^{\lambda t}$ . Ainsi, on injecte ce  $k(t)$  dans l'équation différentielle :

$$\begin{aligned} (*) &\iff k'(t)e^{\lambda t} + k(t)\lambda e^{\lambda t} = \lambda k(t)e^{\lambda t} \\ &\iff k'(t)e^{\lambda t} = 0 \\ &\iff k'(t) = 0 \\ &\iff \exists K \in \mathbb{R} \quad k(t) = K. \end{aligned}$$

Les solutions trouvées dans l'exercice précédent sont donc les uniques solutions du système d'équations différentielles.

De même, pour résoudre une équation différentielle avec 2<sup>nd</sup> membre de la forme

$$(**) : \quad x'(t) - \lambda \cdot x(t) = b(t).$$

La fonction  $t \mapsto x(t)$  est une solution de l'équation SANS 2<sup>nd</sup> membre si et seulement si

$$\exists K \in \mathbb{R}, \forall t \in \mathbb{R}, \quad x(t) = K \cdot e^{\lambda t}.$$

Comment résoudre l'équation différentielle AVEC 2<sup>nd</sup> membre si on connaît la solution générale de l'équation SANS 2<sup>nd</sup> membre ?

On utilise la méthode de la variation de la constante. Soit  $x(t) = k(t) \cdot e^{\lambda t}$ . Ainsi, en injectant cette expression de  $x$  dans l'équation (\*\*), on trouve

$$\begin{aligned} (**) &\iff k'(t)e^{\lambda t} + k(t) \cdot \lambda e^{\lambda t} = \lambda k(t)e^{\lambda t} + b(t) \\ &\iff k'(t)e^{\lambda t} = b(t) \\ &\iff k'(t) = b(t) \cdot e^{-\lambda t} \\ &\iff k(t) = \int_0^t b(u) \cdot e^{-\lambda u} \, du + K \\ &\iff x(t) = \left( \int_0^t b(u) \cdot e^{-\lambda u} \, du + K \right) e^{\lambda t} \\ &\iff x(t) = \underbrace{\int_0^t b(u) \cdot e^{\lambda(t-u)} \, du}_{\text{solution particulière}} + \underbrace{K \cdot e^{\lambda t}}_{\substack{\text{solution} \\ \text{générale} \\ \text{de } (*)}}. \end{aligned}$$

## 2 Valeurs & vecteurs propres

DÉFINITION 3:

Soit  $E$  un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel et  $u : E \rightarrow E$  un endomorphisme.

1. On dit qu'un vecteur  $\vec{x} \in E$  est **un vecteur propre** de  $u$  si  $\vec{x}$  n'est pas nul et  $u(\vec{x})$  est colinéaire à  $\vec{x}$  :  $\vec{x} \neq \vec{0}$  et  $\exists \lambda \in \mathbb{K}, u(\vec{x}) = \lambda \vec{x}$ .
2. On dit qu'un scalaire  $\lambda \in \mathbb{K}$  est **une valeur propre** de  $u$  s'il existe un vecteur non nul  $\vec{x} \in E$  tel que  $u(\vec{x}) = \lambda \vec{x}$ .
3. L'ensemble des valeurs propres de  $u$  est appelé le *spectre* de  $u$  et est noté  $\text{Sp}(u)$ .

I

DÉFINITION 4:

Soit  $n \in \mathbb{N}^*$  et  $A$  une matrice  $n \times n$  à coefficients dans  $\mathbb{K}$ .

1. On dit qu'un vecteur colonne  $X$  est **un vecteur propre** de  $A$  si  $X$  n'est pas nul et  $A \cdot X$  est colinéaire à  $X$  :  $X \neq 0$  et  $\exists \lambda \in \mathbb{K}, A \cdot X = \lambda X$ .
2. On dit qu'un scalaire  $\lambda \in \mathbb{K}$  est **une valeur propre** de  $A$  s'il existe un vecteur colonne non nul  $X$  tel que  $A \cdot X = \lambda X$ .
3. L'ensemble des valeurs propres de  $A$  est appelé le *spectre* de  $A$  et est noté  $\text{Sp}(A)$ .

DÉFINITION 5:

Soit  $E$  un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie et  $u : E \rightarrow E$  un endomorphisme. On dit que  $u$  est *diagonalisable* s'il existe une base  $(\vec{\varepsilon}_1, \dots, \vec{\varepsilon}_n)$  de  $E$  donc chaque vecteur est un vecteur propre de  $u$  :

$$\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, \quad u(\vec{\varepsilon}_i) = \lambda_i \vec{\varepsilon}_i.$$

### 3 Le polynôme caractéristique

PROPOSITION – DÉFINITION 6:

Soit  $A \in \mathcal{M}_{n,n}(\mathbb{K})$  une matrice carrée. La fonction

$$\begin{aligned} \chi_A : \mathbb{K} &\longrightarrow \mathbb{K} \\ x &\longmapsto \det(xI_n - A) \end{aligned}$$

est appelé le *polynôme caractéristique* de  $A$ . On a

$$\forall x \in \mathbb{K}, \quad \chi_A(x) = \det(xI_n - A) = x^n - (\text{tr } A)x^{n-1} + \dots + (-1)^n \det A.$$

DÉMONSTRATION:

On a

$$\det(xI_n - A) = \begin{vmatrix} x - a_{11} & a_{12} & \dots & -a_{1,n} \\ -a_{21} & x - a_{22} & \dots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \ddots & -a_{1,n-1} \\ -a_{n,1} & \dots & -a_{n,n-1} & x - a_{n,n} \end{vmatrix}.$$

PROPOSITION:

Si  $E$  est un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie, alors on peut définir le polynôme caractéristique d'un endomorphisme par

$$\chi_u(x) = \det(x \text{id}_E - u).$$

Si  $A = [u]_{\mathcal{B}}$ , alors  $xI_n - A = [x \text{id}_E - u]_{\mathcal{B}}$  et donc  $\chi_u = \chi_A$ .

DÉMONSTRATION:

On pose  $A$  une matrice  $n \times n$  et  $A'$  une matrice semblable à  $A$ . On pose  $A' = P^{-1} \cdot A \cdot P$ . On calcule  $\det(xI_n - A')$  :

$$\chi_{A'}(x) = \det(xI_n - A') = \det(xI_n - P^{-1} \cdot A \cdot P) = \det(P^{-1}(xI_n - A)P) = \det(xI_n - A) = \chi_A(x).$$

par télescopage.

THÉORÈME 7:

*Le polynôme caractéristique détecte les valeurs propres.*Soit  $A$  une matrice carrée de taille  $n \times n$ . Un scalaire  $\lambda \in \mathbb{K}$  est une valeur propre de  $A$  si et seulement si  $\lambda$  est une racine du polynôme caractéristique  $\chi_A \in \mathbb{K}[X]$ . Autrement

dit,

$$\lambda \in \text{Sp}(A) \iff \det(\lambda I_n - A) = 0.$$

DÉMONSTRATION:  
Soit  $\lambda \in \mathbb{K}$ .

$$\begin{aligned} \lambda \in \text{Sp}(A) &\iff \exists X \neq 0, \quad A \cdot X = \lambda X \\ &\iff \exists X \neq 0, \quad (A - \lambda I_n) \cdot X = 0 \\ &\iff \exists X \neq 0, \quad -(A - \lambda I_n) \cdot X = 0 \\ &\iff \text{Ker}(\lambda I_n - A) \neq \{0_n\} \\ &\iff \lambda I_n - A \text{ n'est pas inversible} \\ &\iff \det(\lambda I_n - A) = 0 \\ &\iff \chi_A(\lambda) = 0. \end{aligned}$$

REMARQUE (Attention):

Parfois, les racines d'un polynôme caractéristique peuvent être complexes et non réelles. Dans ce cas, afin d'éviter toute ambiguïté, on écrit  $\text{Sp}_{\mathbb{R}}(A)$  pour les racines réelles et  $\text{Sp}_{\mathbb{C}}(A)$  pour les racines complexes.

EXERCICE 8: 1. On considère la matrice

$$C = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{matrix} \vec{i} \\ \vec{j} \\ \vec{k} \end{matrix}$$

$$\begin{matrix} f(\vec{i}) & f(\vec{j}) & f(\vec{k}) \end{matrix}$$

On remarque que  $f(\vec{i}) = \vec{i}$  donc  $\vec{i}$  est un vecteur propre et 1 est une valeur propre. Soit  $\lambda \in \mathbb{R}$ .

$$\lambda \in \text{Sp}(C) \iff \det(\lambda I_3 - C) = 0.$$

On calcule  $\det(\lambda I_3 - C)$  :

$$\begin{aligned} \det(\lambda I_3 - C) &= \begin{vmatrix} \lambda - 1 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda & 1 \\ 0 & -1 & \lambda \end{vmatrix} \\ &= (\lambda - 1) \begin{vmatrix} \lambda & 1 \\ -1 & \lambda \end{vmatrix} \\ &= (\lambda - 1)(\lambda^2 + 1) \end{aligned}$$

Et donc

$$\lambda \in \text{Sp}_{\mathbb{R}}(C) \iff \lambda = 1.$$

Attention : on ne peut pas en conclure que la matrice  $C$  n'est pas diagonalisable (il y a peut-être la même valeur propre 3 fois). On montre que la matrice  $C$  n'est pas diagonalisable dans  $\mathbb{R}$  par l'absurde : si

$$P^{-1} \cdot C \cdot P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = I_3$$

alors,  $C = P \cdot I_3 \cdot P^{-1} = I_3$ , ce qui est absurde.

On cherche les valeurs propres dans  $\mathbb{C}$ . Soit  $\lambda \in \mathbb{C}$ .

$$\lambda \in \text{Sp}_{\mathbb{C}}(C) \iff (\lambda - 1)(\lambda - i)(\lambda + i) = 0$$

et donc

$$\lambda \in \text{Sp}_{\mathbb{C}}(C) \iff \lambda \in \{1, i, -i\} \quad \text{i.e.} \quad \text{Sp}_{\mathbb{C}}(C) = \{1, i, -i\}.$$

On peut utiliser la PROPOSITION 18 (mais on la verra plus tard...). On utilise une autre méthode (que l'on doit utiliser à chaque fois que l'on doit diagonaliser une matrice).

Soit  $X = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{3,1}(\mathbb{C})$ .

$$\begin{aligned}
 CX = iX &\iff \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = i \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \\
 &\iff \begin{cases} x = ix \\ -z = iy \\ y = iz \end{cases} \\
 &\iff \begin{cases} x = 0 \\ z = -iy \\ y = iz \end{cases} \\
 &\iff \begin{cases} x = 0 \\ y = iz \end{cases} \quad \text{car } L_2 = -iL_3 \\
 &\iff \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ iz \\ z \end{pmatrix} = z \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ i \\ 1 \end{pmatrix} \\
 &\iff X \in \text{Vect} \begin{pmatrix} 0 \\ i \\ 1 \end{pmatrix}
 \end{aligned}$$

De même, avec  $-i$ , on a

$$\begin{aligned}
 CX = -iX &\iff \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = -i \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \\
 &\iff \begin{cases} x = -ix \\ -z = -iy \\ y = iz \end{cases} \\
 &\iff \begin{cases} x = 0 \\ z = iy \\ y = -iz \end{cases} \\
 &\iff \begin{cases} x = 0 \\ y = -iz \end{cases} \\
 &\iff \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ -iz \\ z \end{pmatrix} = z \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ -i \\ 1 \end{pmatrix} \\
 &\iff X \in \text{Vect} \begin{pmatrix} 0 \\ -i \\ 1 \end{pmatrix}
 \end{aligned}$$

On pose  $\varepsilon_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ ,  $\varepsilon_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ i \\ 1 \end{pmatrix}$  et  $\varepsilon_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ -i \\ 1 \end{pmatrix}$ . De plus,  $\det(\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3) \neq 0$ . D'où la matrice  $C$  est diagonalisable dans  $\mathbb{C}$ .

2. On considère la matrice

$$M = \begin{pmatrix} 7 & & \sqrt{2} \\ & 7 & \\ & & \ddots \\ & & & 7 \end{pmatrix}.$$

La matrice  $M$  a pour polynôme caractéristique  $\chi_M(x)$  :

$$\chi_M(x) = \begin{vmatrix} x-7 & & -\sqrt{2} \\ & x-7 & \\ & & \ddots \\ & & & x-7 \end{vmatrix} = (x-7) \cdot (x-7) \cdots (x-7) = (x-7)^n.$$

Or,  $\lambda \in \text{Sp}(M)$  si et seulement si  $\chi_M(\lambda) = 0$  et donc si et seulement si  $\lambda = 7$ . D'où  $\text{Sp}(M) = \{7\}$ . On procède par l'absurde : si  $M$  est diagonalisable, il existe  $P \in \text{GL}_n(\mathbb{K})$ , telle que  $M = P^{-1} \cdot 7I_n \cdot P = P^{-1} \cdot P \cdot 7I_n = 7I_n$ , ce qui est absurde.

REMARQUE 9:

Si  $A \in \mathcal{M}_{n,n}(\mathbb{R})$  (par exemple  $A = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ ), alors  $\chi_A(X) \in \mathbb{R}_n[X]$  ( $\chi_A(X) = X^2 + 1$ , et donc  $\text{Sp}_{\mathbb{R}}(A) = \emptyset$ , mais  $\text{Sp}_{\mathbb{C}}(A) = \{-i, i\}$ ). Ainsi,

$$A \in \mathcal{M}_{n,n}(\mathbb{R}) \implies \forall \lambda \in \text{Sp}_{\mathbb{C}}(A), \bar{\lambda} \in \text{Sp}_{\mathbb{C}}(A).$$

Autrement dit, le spectre complexe d'une matrice réelle est stable par conjugaison. En effet, si  $\lambda \in \text{Sp}_{\mathbb{C}}(A)$ , alors il existe  $0 \neq X \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{C})$ , tel  $A \cdot X = \lambda X$ . D'où

$$\begin{pmatrix} a_{1,1} & \dots & a_{1,n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n,1} & \dots & a_{n,n} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} z_1 \\ \vdots \\ z_n \end{pmatrix} = \lambda \begin{pmatrix} z_1 \\ \vdots \\ z_n \end{pmatrix} \quad \text{et donc} \quad \begin{pmatrix} \bar{a}_{1,1} & \dots & \bar{a}_{1,n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \bar{a}_{n,1} & \dots & \bar{a}_{n,n} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \bar{z}_1 \\ \vdots \\ \bar{z}_n \end{pmatrix} = \bar{\lambda} \begin{pmatrix} \bar{z}_1 \\ \vdots \\ \bar{z}_n \end{pmatrix}.$$

Autrement dit,  $A \cdot \bar{X} = \bar{\lambda} \bar{X}$  où  $\bar{X} = \begin{pmatrix} \bar{z}_1 \\ \vdots \\ \bar{z}_n \end{pmatrix}$ . Or,  $\bar{X} \neq 0$ , et  $A \cdot \bar{X} = \bar{\lambda} \bar{X}$ . D'où  $\bar{X}$  est un vecteur propre, et il est associé à  $\bar{\lambda}$  qui est donc une valeur propre. Et même,  $\dim \text{SEP}(\lambda) = \dim \text{SEP}(\bar{\lambda})$ .

PROPOSITION 10:

Soit  $A \in \mathcal{M}_{n,n}(\mathbb{K})$  une matrice carrée.

1. Le spectre de  $A$  contient au plus  $n$  valeurs propres distinctes deux à deux.
2. Pour chaque valeur propre  $\lambda \in \text{Sp}(A)$ , on note  $m_\lambda$  la multiplicité de la racine  $\lambda$  dans le polynôme  $\chi_A$ . Si le polynôme caractéristique est scindé alors

$$\text{tr } A = \sum_{\lambda \in \text{Sp}(A)} m_\lambda \cdot \lambda \quad \text{et} \quad \det A = \prod_{\lambda \in \text{Sp}(A)} \lambda^{m_\lambda}.$$

3. La matrice  $A$  et sa transposée ont le même polynôme caractéristique :  $\chi_{A^\top} = \chi_A$ , et donc le même spectre  $\text{Sp}(A) = \text{Sp}(A^\top)$ .

Si la matrice  $A$  est diagonalisable, alors il existe une matrice inversible  $P$  telle que

$$D = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \dots & 0 & \lambda_n \end{pmatrix} = P^{-1} \cdot A \cdot P$$

et donc  $\text{tr } A = \text{tr } D = \sum_{i=1}^n \lambda_i$  et  $\det A = \det D = \prod_{i=1}^n \lambda_i$ . Mais, dans la proposition précédente, on n'a pas l'hypothèse que la matrice est diagonalisable. Ce raisonnement est un cas particulier de la proposition précédente. En effet, si  $A$  est diagonalisable alors  $\chi_A = \chi_D$  :

$$\begin{aligned} \chi_A(X) &= \chi_D(X) \\ \det(XI_n - A) &= \det(XI_n - D) \\ &= \det(XI_n - P^{-1}AP) \\ &= \det\left(P^{-1} \cdot (XI_n - A) \cdot P\right) \\ &= (X - \lambda_1) \cdots (X - \lambda_n) \end{aligned}$$

DÉMONSTRATION: 3. On calcule

$$\begin{aligned}\chi_{A^\top}(x) &= \det(xI_n - A^\top) \\ &= \det((xI_n - A)^\top) \\ &= \det(xI_n - A)\end{aligned}$$

car le déterminant est invariant par passage à la transposée. Or, comme  $\chi_{A^\top} = \chi_A$ , alors  $\text{Sp}(A) = \text{Sp}(A^\top)$ .

2. On sait d'après la proposition 6,

$$\chi_A(x) = x^n - \text{tr}(A)x^{n-1} + \dots + (-1)^n \det(A).$$

Or, par hypothèse,  $\chi_A$  est scindé d'où

$$\chi_A(x) = (x - \lambda_1)(x - \lambda_2) \cdots (x - \lambda_n).$$

Les scalaires  $\lambda_1, \dots, \lambda_n$  sont donc les valeurs propres de  $A$ . Ainsi, le coefficient devant le  $x^{n-1}$  est donc  $-(\lambda_1 + \lambda_2 + \dots + \lambda_n)$  et, le coefficient devant le  $x^0$  est donc  $(-\lambda_1)(-\lambda_2) \cdots (-\lambda_n)$ . D'où, par identification

$$\det(A) = \lambda_1 \cdot \lambda_2 \cdots \lambda_n \quad \text{et} \quad \text{tr}(A) = \lambda_1 + \dots + \lambda_n.$$

## 4 Les sous-espaces propres

DÉFINITION 11:

Soient  $E$  un sous-espace vectoriel et  $u : E \rightarrow E$  un endomorphisme et  $\lambda$  une valeur propre de  $u$ . Le sous-espace vectoriel  $\text{Ker}(\lambda \text{id}_E - u) = \text{Ker}(u - \lambda \text{id}_E)$  est appelé le *sous-espace propre* de  $u$  associé à la valeur propre  $\lambda$ . Il est parfois noté  $E_\lambda$ , ou  $\text{SEP}(\lambda)$ .

Soit  $X \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K})$ .

$$\begin{aligned}AX = \lambda X &\iff AX - \lambda X = 0 \\ &\iff (A - \lambda I_n)X = 0 \\ &\iff X \in \text{Ker}(A - \lambda I_n)\end{aligned}$$

Attention, on ne dit pas que  $\text{SEP}(\lambda)$  est l'ensemble des vecteurs propres associés à la valeur propre  $\lambda$ . En effet,  $0 \in \text{SEP}(\lambda)$  mais  $0$  n'est pas un vecteur propre (par définition).

REMARQUE:

$\text{SEP}(\lambda)$  est un sous-espace vectoriel de  $E$ . En effet, c'est un noyau. Autre méthode :  $0 \in \text{SEP}(\lambda)$  car  $A \cdot 0 = \lambda 0$  et  $\text{SEP}(\lambda)$  est stable par combinaisons linéaires (superposition), car si  $X_1$  et  $X_2$  sont deux éléments de  $\text{SEP}(\lambda)$ , alors

$$A(\alpha X_1 + \beta X_2) = \alpha A X_1 + \beta A X_2 = \alpha \lambda X_1 + \beta \lambda X_2 = \lambda(\alpha X_1 + \beta X_2).$$

EXERCICE 12:

On considère la matrice

$$B = \begin{pmatrix} 7 & 1 \\ 0 & 7 \end{pmatrix}.$$

Cherchons les valeurs propres de  $B$  :

$$\begin{aligned}\lambda \in \text{Sp}(B) &\iff \det(\lambda I_2 - B) = 0 \\ &\iff \begin{vmatrix} \lambda - 7 & -1 \\ 0 & \lambda - 7 \end{vmatrix} = 0 \\ &\iff (\lambda - 7)^2 = 0.\end{aligned}$$

On en déduit que  $\text{Sp}(B) = \{7\}$ . Soit  $X = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{2,1}(\mathbb{K})$ .

$$\begin{aligned} X \in \text{SEP}(7) &\iff B \cdot X = 7X \\ &\iff \begin{pmatrix} 7 & 1 \\ 0 & 7 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = 7 \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \\ &\iff \begin{cases} 7x + y = 7x \\ 7y = 7y \end{cases} \\ &\iff y = 0 \\ &\iff X = \begin{pmatrix} x \\ 0 \end{pmatrix} = x \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

On en déduit que  $\text{SEP}(7) = \text{Vect} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ .

On considère à présent la matrice  $D$  :

$$D = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{matrix} \vec{i} \\ \vec{j} \\ \vec{k} \\ f(\vec{i}) & f(\vec{j}) & f(\vec{k}) \end{matrix}$$

Soit  $\lambda \in \mathbb{K}$ .

$$\begin{aligned} \lambda \in \text{Sp}(D) &\iff \begin{vmatrix} \lambda - 1 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda & -1 \\ 0 & -1 & \lambda \end{vmatrix} = 0 \\ &(\lambda - 1)(\lambda^2 - 1) = \\ &(\lambda - 1)(\lambda - 1)(\lambda + 1) = \\ &(\lambda - 1)^2(\lambda + 1) = \end{aligned}$$

D'où  $\text{Sp}(D) = \{1, -1\}$ . Soit  $X = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{3,1}(\mathbb{K})$ .

$$\begin{aligned} X \in \text{SEP}(1) &\iff D \cdot X = 1X \\ &\iff \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \\ &\iff \begin{cases} x = x \\ z = y \\ y = z \end{cases} \\ &\iff y = z \\ &\iff X = \begin{pmatrix} x \\ y \\ y \end{pmatrix} \\ &\iff X = x \underbrace{\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}}_{\varepsilon_1} + y \underbrace{\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}}_{\varepsilon_2}. \end{aligned}$$

Donc  $\text{SEP}(1) = \text{Vect}(\varepsilon_1, \varepsilon_2)$ . C'est un plan car  $(\varepsilon_1, \varepsilon_2)$  est une famille libre. De même pour  $\text{SEP}(-1)$ .

REMARQUE 13:

Soit  $u : E \rightarrow E$  un endomorphisme d'un espace vectoriel  $E$ .

1. Si  $0 \in \text{Sp}(u)$ , alors il existe un vecteur  $\vec{x}$  non nul tel que  $\vec{x} \in \text{Ker}(u)$  et donc l'endomorphisme  $u$  n'est pas injectif.
2. Si  $0 \notin \text{Sp}(u)$ , alors  $\text{Ker}(u) = \text{SEP}(0) = \{0\}$  (car  $\text{SEP}(0) = \text{Ker}(0 \text{ id}_E - u) = \text{Ker } u$ ) et donc l'endomorphisme  $u$  est injectif.



**Attention : les sous-espaces propres ne sont pas supplémentaires.**

DÉMONSTRATION (méthode 1):

Soit  $\vec{x}_1 \in \text{SEP}(\lambda_1)$ ,  $\vec{x}_2 \in \text{SEP}(\lambda_2)$ , ...,  $\vec{x}_r \in \text{SEP}(\lambda_r)$  tels que  $\vec{x}_1 \neq \vec{0}$ ,  $\vec{x}_2 \neq \vec{0}$ , ...,  $\vec{x}_r \neq \vec{0}$ . Ainsi  $u(\vec{x}_1) = \lambda_1 \vec{x}_1$ ,  $u(\vec{x}_2) = \lambda_2 \vec{x}_2$ , ..., et  $u(\vec{x}_r) = \lambda_r \vec{x}_r$ . Soient  $\alpha_1, \dots, \alpha_r \in \mathbb{K}$ . On suppose  $\alpha_1 \vec{x}_1 + \dots + \alpha_r \vec{x}_r = \vec{0}$  ( $L_1$ ). Alors,

$$u(\alpha_1 \vec{x}_1 + \dots + \alpha_r \vec{x}_r) = u(\vec{0}) = \vec{0}$$

d'où  $\alpha \lambda_1 \vec{x}_1 + \alpha_2 \lambda_2 \vec{x}_2 + \dots + \alpha_r \lambda_r \vec{x}_r = \vec{0}$  ( $L_2$ ). D'où, en calculant  $L_2 - \lambda_r L_1$ , on a

$$\alpha_1(\lambda_1 - \lambda_r) \vec{x}_1 + \alpha_2(\lambda_2 - \lambda_r) \vec{x}_2 + \dots + \alpha_{r-1}(\lambda_{r-1} - \lambda_r) \vec{x}_{r-1} = \vec{0}.$$

Par récurrence, pour  $r = 1$ , c'est vrai : la famille  $(\vec{x}_1)$  est libre. On suppose la propriété vraie pour  $r - 1$  vecteurs. On veut le prouver pour  $r$  vecteurs. En utilisant le calcul ci-dessus, comme les valeurs propres sont distinctes deux à deux, on en déduit que  $\alpha_1 = \alpha_2 = \dots = \alpha_{r-1} = 0$ . Or, d'après  $L_1$ ,  $\alpha_r = 0$ .

DÉMONSTRATION (méthode 2):

On sait que  $\text{SEP}(\lambda_1) = \text{Ker}(\lambda_1 \text{id} - u)$ ,  $\text{SEP}(\lambda_2) = \text{Ker}(\lambda_2 \text{id} - u)$ , ... Or,  $\lambda_2 \text{id} - u$  est un polynôme  $P_2(u)$ , et de même pour  $P_3(u)$ , ... Les  $r$  polynômes sont premiers entre-eux car  $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_r$  sont distincts deux à deux. D'où, d'après le lemme des noyaux,

$$\text{Ker} \left( P(u) \right) = \bigoplus_{k=1}^n \text{Ker} (P_k(u))$$

où  $P = P_1 \times P_2 \times \dots \times P_r$ . La somme des sous-espaces propres est donc directe.

EXERCICE 17:

Soient  $\lambda_1, \dots, \lambda_r \in \mathbb{R}$  distincts deux à deux. Montrons que, si  $\forall x \in \mathbb{R}$ ,  $\alpha_1 e^{\lambda_1 x} + \dots + \alpha_r e^{\lambda_r x} = 0$ , alors  $\alpha_1 = \dots = \alpha_r = 0$ . On peut procéder de différentes manières : le déterminant de VANDERMONDE, par analyse-synthèse, ou, en utilisant

$$\frac{d}{dx} (e^{\lambda_k x}) = \lambda_k e^{\lambda_k x}, \quad \text{d'où} \quad \varphi(f_k) = \lambda_k f_k, \quad \text{avec} \quad f_k : x \mapsto e^{\lambda_k x} \quad \text{et} \quad \varphi : f \mapsto f'.$$

On doit vérifier que les  $f_k$  sont des vecteurs et l'application  $\varphi$  soit un endomorphisme. On se place donc dans l'espace vectoriel  $\mathcal{C}^\infty$ . (On ne peut pas se placer dans l'espace  $\mathcal{C}^k$ , car sinon l'application  $\varphi$  est de l'espace  $\mathcal{C}^k$  à  $\mathcal{C}^{k-1}$ , ce n'est donc pas un endomorphisme ; ce n'est pas le cas pour l'espace  $\mathcal{C}^\infty$ .) Or, les  $\lambda_k$  sont distincts deux à deux d'où les vecteurs propres  $f_k$  sont linéairement indépendants. Et donc si  $\alpha_1 f_1 + \alpha_2 f_2 + \dots + \alpha_r f_r = 0$  alors  $\alpha_1 = \dots = \alpha_r = 0$ . Mais, comme  $\forall x \in \mathbb{R}$ ,  $\alpha_1 f_1(x) + \alpha_2 f_2(x) + \dots + \alpha_r f_r(x) = 0$ , on en déduit que

$$\alpha_1 = \dots = \alpha_r = 0.$$

## 5 Critères de diagonalisabilité

PROPOSITION 18 (une condition suffisante pour qu'une matrice soit diagonalisable):

Soit  $A$  une matrice carrée de taille  $n \geq 2$ . Si  $A$  possède  $n$  valeurs propres distinctes deux à deux, alors  $A$  est diagonalisable.

REMARQUE:

La réciproque est fautive : par exemple, pour  $n > 1$ ,  $7I_n$  est diagonalisable car elle est diagonale. Mais, elle ne possède pas  $n$  valeurs propres distinctes deux à deux.

DÉMONSTRATION:

On suppose que la matrice  $A \in \mathcal{M}_{n,n}(\mathbb{K})$  possède  $n$  valeurs propres distinctes deux à deux (i.e.  $\text{Card Sp}(A) = n$ ). D'où, d'après la proposition 16, les  $n$  vecteurs propres associés  $\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n$  sont libres. D'où  $(\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n)$  est une base formée de vecteurs propres. Donc, d'après la définition 5, la matrice  $A$  est diagonalisable.

THÉORÈME 19 (conditions nécessaires et suffisantes pour qu'une matrice soit diagonalisable):



La matrice  $E$  ci-dessous est-elle diagonalisable ?

Soit  $\lambda \in \mathbb{R}$ . On sait que  $\lambda \in \text{Sp}(E)$  si et seulement si  $\det(\lambda I_3 - E) = 0$ . Or

$$\det(\lambda I_3 - E) = \begin{vmatrix} \lambda - 7 & 0 & -1 \\ 0 & \lambda - 3 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda - 7 \end{vmatrix} = (\lambda - 7)^2 \cdot (\lambda - 3)^1.$$

Donc  $\text{Sp}(E) = \{3, 7\}$ ,  $1 \leq \dim(\text{SEP}(3)) \leq 1$ , et  $1 \leq \dim(\text{SEP}(7)) \leq 2$ . La matrice  $E$  est diagonalisable si et seulement si  $\dim(\text{SEP}(3)) + \dim(\text{SEP}(7)) = 3$ , donc si et seulement si  $\dim(\text{SEP}(7)) = 2$ . On cherche donc la dimension de ce sous-espace propre : soit  $X = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{3,1}(\mathbb{R})$ . On sait que

$$\begin{aligned} X \in \text{SEP}(7) &\iff E \cdot X = 7X \\ &\iff \begin{pmatrix} 7 & 0 & 1 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 7 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = 7 \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \\ &\iff \begin{cases} 7x + 0y + 1z = 7x \\ 3y = 7y \\ 7z = 7z \end{cases} \\ &\iff \begin{cases} z = 0 \\ y = 0 \end{cases} \\ &\iff X = \begin{pmatrix} x \\ 0 \\ y \end{pmatrix} = x \underbrace{\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}}_{\varepsilon_1} \end{aligned}$$

Donc  $\text{SEP}(7) = \text{Vect}(\varepsilon_1)$ , d'où  $\dim(\text{SEP}(7)) = 1$ . Donc la matrice  $E$  n'est pas diagonalisable.

## 6 Trigonalisation

Trigonaliser une matrice ne sert que si la matrice n'est pas diagonalisable.

DÉFINITION 21:

On dit d'une matrice carrée  $A \in \mathcal{M}_{n,n}(\mathbb{K})$  qu'elle est *trigonalisable* s'il existe une matrice inversible  $P$  telle que  $P^{-1} \cdot A \cdot P$  est triangulaire :

$$P^{-1} \cdot A \cdot P = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & & \\ & \ddots & & \\ & & * & \\ & & & \ddots \\ & & 0 & & \lambda_r \end{pmatrix}.$$

REMARQUE 22:

∅

THÉORÈME 23:

Une matrice carrée  $A \in \mathcal{M}_{n,n}(\mathbb{K})$  est trigonalisable si et seulement si son polynôme caractéristique  $\chi_A \in \mathbb{K}[X]$  est scindé.

DÉMONSTRATION (par récurrence sur  $n$ , la largeur de la matrice): — Si  $n = 1$ , alors la matrice  $A = (a_{11})$  est déjà triangulaire.

— On suppose le polynôme caractéristique  $\chi_A$  de la matrice scindé dans  $\mathbb{K}[X]$ , d'où il a au moins une racine dans  $\mathbb{K}$ . D'où, la matrice  $A$  a au moins une valeur propre  $\lambda_1 \in \mathbb{K}$ . Il existe donc un vecteur non nul  $\vec{\varepsilon}_1$  tel que  $A \cdot \vec{\varepsilon}_1 = \lambda_1 \vec{\varepsilon}_1$ . On complète  $(\vec{\varepsilon}_1)$  en une base de  $\mathbb{K}^n$  :

$(\vec{\varepsilon}_1, \vec{e}_2, \dots, \vec{e}_n)$ . En changeant de base, il existe une matrice inversible  $P$  telle que

$$A' = P^{-1} \cdot A \cdot P = \begin{pmatrix} \lambda_1 & * & \dots & * \\ 0 & & & \\ \vdots & & B & \\ 0 & & & \\ f(\vec{\varepsilon}_1) & f(\vec{e}_1) & \dots & f(\vec{e}_n) \end{pmatrix} \begin{matrix} \varepsilon_1 \\ e_1 \\ \vdots \\ e_n \end{matrix}$$

Comme le polynôme caractéristique est invariant par changement de base, on en déduit que

$$\chi_A(x) = \chi_{A'}(x) = \begin{vmatrix} x - \lambda_1 & * \\ 0 & xI_{n-1} - B \end{vmatrix} = (x - \lambda_1) \cdot \Pi(x).$$

Or, comme  $\chi_A$  est scindé,  $\Pi(x)$  est aussi scindé. Or,  $\Pi(x) = \det(xI_{n-1} - B)$  d'où  $B$  est trigonalisable.

COROLLAIRE 24:

Toute matrice de  $\mathcal{M}_{n,n}(\mathbb{C})$  est trigonalisable.

EXERCICE 25:

Soit une matrice carrée  $A \in \mathcal{M}_{n,n}(\mathbb{K})$  (où  $\mathbb{K}$  est  $\mathbb{R}$  ou  $\mathbb{C}$ ). Montrer que

- (1) la matrice  $A$  est nilpotente  $\iff$  le polynôme caractéristique de  $A$  est  $\chi_A(X) = X^n$  (2)  
 $\iff$  la matrice  $A$  est trigonalisable avec des zéros  
sur sa diagonale (3)

On montre “(1)  $\implies$  (2),” “(2)  $\implies$  (3)” puis “(3)  $\implies$  (1).”

“(3)  $\implies$  (1)” Il existe donc une matrice inversible  $P$  telle que  $T = P^{-1} \cdot A \cdot P$  et  $T$  est une matrice trigonalisable. Or, à chaque produit  $A^n \cdot A$ , une « sur-diagonale » de zéros supplémentaires. D'où, à partir d'un certain rang  $p$ , on a  $A^p = 0$ . La matrice  $A$  est donc nilpotente.

“(2)  $\implies$  (3)” On sait que  $\chi_A = X^n = (X - 0)^n$  est scindé, d'où  $A$  est trigonalisable. Il existe donc une matrice inversible  $P$  telle que

$$P^{-1} \cdot A \cdot P = A' = \begin{pmatrix} \lambda_1 & * & \dots & * \\ 0 & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & * \\ 0 & \dots & 0 & \lambda_n \end{pmatrix}.$$

Et donc  $\chi_{A'}(x) = (x - \lambda_1)(x - \lambda_2) \cdots (x - \lambda_n)$ . Or, le polynôme caractéristique est invariant par changement de base, d'où  $\lambda_1 = \lambda_2 = \dots = \lambda_n$ .

“(1)  $\implies$  (2)” On passe dans  $\mathbb{C}$  alors  $\chi_A$  est scindé dans  $\mathbb{C}$ . D'où, il existe  $(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n) \in \mathbb{C}^n$  tels que

$$\chi_A(X) = (X - \lambda_1)(X - \lambda_2) \cdots (X - \lambda_n).$$

D'où, chaque  $\lambda_i$  est une valeur propre complexe de la matrice  $A$ . Or  $A$  est nilpotente, d'où, par définition, il existe  $p \in \mathbb{N}$  tel que  $A^p = 0$ . Les scalaires  $\lambda_i$  sont dans le spectre de  $A$  : en effet, il existe un vecteur colonne  $X$  non nul tel que  $A \cdot X = \lambda_i X$ , d'où  $A^2 \cdot X = A \cdot AX = A \cdot \lambda_i X = \lambda_i^2 X$ . De même,  $A^3 \cdot X = A \cdot A^2 \cdot X = A \cdot \lambda_i^2 X = \lambda_i^3 (A \cdot X) = \lambda_i^3 X$ . Et, de « proche en proche », on a donc

$$\forall k \in \mathbb{N}, A^k \cdot X = \lambda_i^k X.$$

En particulier, si  $k = p$ , on a  $0 = 0 \cdot X = A^p \cdot X = \lambda_i^p X$ . D'où  $\lambda_i^p X = 0$ . Or,  $X \neq 0$ , d'où  $\lambda_i^p = 0$  et donc  $\lambda_i = 0$ . Finalement,  $\chi_A(X) = (X - \lambda_1) \cdots (X - \lambda_n) = (X - 0) \cdots (X - 0) = X^n \in \mathbb{C}[X]$ . On a donc  $\chi_A(X) \in \mathbb{R}[X]$ .

## 7 Le théorème de CAYLEY & HAMILTON et les sous-espaces caractéristiques

THÉORÈME 26 (de CAYLEY & HAMILTON):

Le polynôme caractéristique d'une matrice  $A \in \mathcal{M}_{n,n}(\mathbb{K})$  est un polynôme annulateur de cette matrice :

$$\chi_A(A) = 0.$$

□

RAPPEL:

Un polynôme  $P$  est annulateur de la matrice  $A$  si et seulement si  $P$  divise  $\mu_A$ .

COROLLAIRE 27:

Le polynôme minimal divise le polynôme caractéristique.

EXERCICE 28:

Déterminer le polynôme minimal de la matrice  $E$  de l'exercice 20 :

$$E = \begin{pmatrix} 7 & 0 & 1 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 7 \end{pmatrix}.$$

On doit donc déterminer le polynôme unitaire de degré minimal annulateur de  $E$ . D'après le théorème de CAYLEY & HAMILTON,  $\chi_E$  est un polynôme annulateur. Or,  $\chi_E(X) = (X - 7)^2(X - 3)$  car c'est un déterminant triangulaire. D'où  $\mu_E(X)$  est égal à  $(X - 7)^2(X - 3)$  ou  $(X - 7)(X - 3)$  ou  $(X - 7)^2$  ou  $(X - 7)$  ou  $(X - 3)$ . Or,

$$\begin{aligned} (E - 7I_3) \cdot (E - 3I_3) &= \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & -4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 4 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} * & * & 4 \\ * & * & * \\ * & * & * \end{pmatrix} \neq 0_{\mathcal{M}_{3,3}(\mathbb{K})} \end{aligned}$$

Ainsi,  $\mu_A(X) \neq (X - 7)(X - 3)$  et  $\mu_A(X) \neq (X - 7)$ . Et,

$$(E - 3I_3)^2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & -4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}^2 = \begin{pmatrix} * & * & * \\ * & 16 & * \\ * & * & * \end{pmatrix} \neq 0_{\mathcal{M}_{3,3}(\mathbb{K})}.$$

Ainsi,  $\mu_A(X) \neq (X - 3)^2$  et aussi  $\mu_A(X) \neq (X - 3)$ . On en déduit que  $\mu_A = \chi_E$ .

DÉFINITION 29:

Si le polynôme caractéristique d'une matrice  $A \in \mathcal{M}_{n,n}(\mathbb{K})$  est scindé, alors le *sous-espace caractéristique* de  $A$  associé à chaque valeur propre  $\lambda$  est

$$C_\lambda = \text{Ker}(\lambda I_n - A)^{m_\lambda},$$

où  $m_\lambda$  est la multiplicité de la racine  $\lambda$  dans le polynôme caractéristique.

PROPOSITION 30:

Les sous-espaces caractéristiques sont supplémentaires :

$$E = \bigoplus_{\lambda \in \text{Sp}(A)} C_\lambda$$

et de dimensions  $\dim C_\lambda = m_\lambda$ .

DÉMONSTRATION:

Comme le polynôme  $\chi_A$  est scindé, alors

$$\chi_A(X) = (X - \lambda_1)^{m_{\lambda_1}} \times \cdots \times (X - \lambda_r)^{m_{\lambda_r}}$$

et donc, d'après le théorème des noyaux,

$$\text{Ker}(\chi_A(M)) = \bigoplus_{\lambda \in \text{Sp}(A)} \text{Ker}(M - \lambda I_n)^{m_\lambda}$$

car les polynômes  $(X - \lambda_i)$  sont premiers deux à deux. En particulier, si  $M = A$ , alors

$$E = \bigoplus_{\lambda \in \text{Sp}(A)} \overbrace{\text{Ker}((\lambda I_n - A)^{m_\lambda})}^{\text{sous-espace caractéristique de } A \text{ associé à } \lambda : C_\lambda}.$$

## 8 Polynômes annulateurs

Si  $\vec{x} \in E$  est un vecteur propre de  $u \in \mathcal{L}(E)$ , associé à la valeur propre  $\lambda \in \mathbb{K}$ , alors

$$u^2(\vec{x}) = u(u(\vec{x})) = u(\lambda \vec{x}) = \lambda u(\vec{x}) = \lambda^2 \vec{x}.$$

Ainsi, par récurrence,

$$\forall k \in \mathbb{N}^*, \quad u^k(\vec{x}) = \lambda^k \vec{x}.$$

Mais, comme  $u^0 = \text{id}_E$ , on a donc  $u^0(\vec{x}) = \text{id}_E(\vec{x}) = \vec{x} = \lambda^0 \vec{x}$ , et le résultat précédent est également vrai pour  $k = 0$ . Par linéarité, si  $P(X) = a_0 + a_1 X + \dots + a_d X^d$ , alors  $P(u) = a_0 \text{id}_E + a_1 u + \dots + a_d u^d$ , et donc  $P(u)(\vec{x}) = a_0 \vec{x} + a_1 \lambda \vec{x} + \dots + a_d \lambda^d \vec{x} = P(\lambda) \vec{x}$ .

**PROPOSITION 31** (très souvent utile):

Soit  $P \in \mathbb{K}[X]$  un polynôme annulateur de  $u \in \mathcal{L}(E)$ . Si  $\lambda$  est une valeur propre de  $u$  (i.e.  $P(u) = 0$ ), alors  $\lambda$  est racine de  $P$  :

$$\forall \lambda \in \mathbb{K}, \quad \lambda \in \text{Sp}(u) \quad \xrightarrow{\text{si } P(u)=0} \quad P(\lambda) = 0.$$

Autrement dit, le spectre de  $u$  est inclus dans l'ensemble des racines d'un polynôme annulateur de  $u$ . Mais, en général, il n'y a pas égalité.

**REMARQUE:**

**La réciproque de la proposition est fautive.** Par exemple,  $(X - 1)(X - 7)$  est annulateur de  $I_n$ , mais  $\text{Sp}(I_n) = \{1\} \subsetneq \{1, 7\}$ , qui est l'ensemble des racines de  $(X - 1)(X - 7)$ .

**DÉMONSTRATION:**

Si  $\vec{x}$  est un vecteur propre de  $u$  associé à la valeur propre  $\lambda$  (i.e.  $\vec{x} \neq \vec{0}$  et  $u(\vec{x}) = \lambda \vec{x}$ ), alors  $P(u) = 0$  car  $\vec{x} \neq \vec{0}$ .

Néanmoins, il y a égalité pour certains polynômes : le polynôme caractéristique (d'après le théorème 7), et le polynôme minimal (dans la proposition 32, suivante).

**PROPOSITION 32:**

Le spectre de  $u$  est égal à l'ensemble des racines du polynôme minimal (qui a donc les mêmes racines que le polynôme caractéristique).

**MÉTHODE 1** (à l'aide du théorème de CAYLEY et HAMILTON) On veut montrer que le polynôme caractéristique et le polynôme minimal ont les mêmes racines.

- Tout d'abord, On sait que le polynôme minimal divise le polynôme caractéristique. Ainsi, il existe un polynôme  $Q$ , tel que  $\chi_A(X) = \mu_A(X) \times Q(X)$ . Ainsi, toute racine du polynôme minimal  $\mu_A$  est aussi racine du polynôme caractéristique  $\chi_A$ .
- Puis, soit  $\lambda$  une racine de  $\chi_A$ . D'où  $\lambda$  est une valeur propre de  $A$ . D'où  $\lambda \in \text{Sp}(A)$ . Or, le spectre de  $A$  est inclus dans l'ensemble des racines de  $\mu_A$  car  $\mu_A$  est polynôme annulateur (d'après la proposition 31). D'où  $\lambda$  est racine de  $\mu_A$ .

**MÉTHODE 2** (sans le théorème de CAYLEY et HAMILTON)

- La démonstration précédente n'utilisant pas, dans ce sens là, le théorème de CAYLEY et HAMILTON. On sait donc que l'ensemble des racines de  $\chi_A$  est inclus dans l'ensemble des racines de  $\mu_A$ .

- Reste à montrer l'autre inclusion : l'ensemble des racines de  $\mu_A$  est inclus dans l'ensemble des racines de  $\chi_A$ , qui est le spectre de  $A$ . Soit  $\lambda$  une racine de  $\mu_A$ . Alors, il existe un polynôme  $Q$ , tel que  $\mu_A(X) = (X - \lambda) \times Q(X)$ . D'où  $0_{\mathcal{M}_{n,n}(\mathbb{K})} = \mu_A(A) = (A - \lambda I_n) \times Q(A)$ . Or,  $Q(A) \neq 0_{\mathcal{M}_{n,n}(\mathbb{K})}$ . En effet, si  $Q(A) = 0_{\mathcal{M}_{n,n}(\mathbb{K})}$ , alors, comme  $\deg Q < \deg \mu_A$ , on a donc un polynôme annulateur de  $A$  ayant un degré plus petit que celui du polynôme minimal : ce qui est absurde. Il existe donc  $X \in \mathcal{M}_{n,n}(\mathbb{K})$  tel que  $Q(A) \cdot X \neq 0$ . Soit  $U$  ce vecteur :  $U = Q(A) \cdot X$ . Alors, comme  $(A - \lambda I_n) \times Q(A) = 0_{\mathcal{M}_{n,n}(\mathbb{K})}$ , on en déduit que  $(A - \lambda I_n) \cdot Q(A) \cdot X = 0 \cdot X$ . D'où  $(A - \lambda I_n) \cdot U = 0$ , et donc  $A \cdot U = \lambda U$ , et comme  $U \neq 0$ , on en déduit que  $\lambda \in \text{Sp}(A)$ .

THÉORÈME 33:

Une matrice  $A$  est

1. trigonalisable si et seulement si elle possède un polynôme annulateur scindé;
2. diagonalisable si et seulement si elle possède un polynôme annulateur scindé à racines simples.

RAPPEL:

Une matrice  $A$  est trigonalisable si et seulement si

- $\chi_A$  scindé (théorème 3);
- elle possède un polynôme annulateur scindé (théorème 33).

Une matrice  $A$  est diagonalisable si et seulement si

- $\sum_{\lambda \in \text{Sp}(A)} \dim(\text{SEP}(\lambda))$  est la taille de la matrice  $A$  (théorème 19);
- les sous-espaces propres sont supplémentaires;
- $\chi_A$  est scindé et  $\forall \lambda \in \text{Sp}(A)$ ,  $\dim(\text{SEP}(\lambda)) = m_\lambda$ ;
- elle possède un polynôme annulateur scindé à racines simples (théorème 33).

Une matrice  $A$  est diagonalisable si  $\text{Card}(\text{Sp}(A))$  est la taille de la matrice  $A$ .

EXERCICE 34:

Soit  $n \geq 2$ . Montrer que la matrice

$$J = \begin{pmatrix} 0 & 1 & \dots & 1 \\ 1 & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & 1 \\ 1 & \dots & 1 & 0 \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{n,n}(\mathbb{K})$$

est diagonalisable, déterminer son spectre et ses sous-espaces propres.

Secret (pour plus tard) la matrice  $J$  est symétrique, donc diagonalisable.

On remarque que  $J \begin{pmatrix} 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix} = (n-1) \begin{pmatrix} 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}$ , et  $J + I_n = \begin{pmatrix} 1 & \dots & 1 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & \dots & 1 \end{pmatrix}$ , d'où  $\text{rg}(J + I_n) = 1$ , et donc d'après le théorème du rang,  $\dim \text{Ker}(J + I_n) = n - 1 = \dim \text{Ker}(J - \lambda I_n)$ , avec  $\lambda = -1$ . D'où  $\dim \text{SEP}_J(-1) + \dim \text{SEP}_J(n-1) = n$  qui est la taille de  $J$  donc  $J$  est diagonalisable.

Autre méthode : on a déjà fait ça au chapitre II. :

$$(J + I_n)^2 = \begin{pmatrix} 1 & \dots & 1 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & \dots & 1 \end{pmatrix}^2 = \begin{pmatrix} n & \dots & n \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ n & \dots & n \end{pmatrix} = n(I_n + J).$$

D'où  $I_n + 2J + J^2 = nI_n + nJ$ . D'où  $J^2 - (n-2)J - (n-1)I_n = 0$ . Ainsi le polynôme  $P(X) = X^2 - (n-2)X - (n-1)$  est annulateur de la matrice  $J$ . Or,  $P(X) = (X+1)(X-(n-1))$  est scindé à racines simples. D'où la matrice  $J$  est diagonalisable.

D'où  $\text{Sp}(J) \subset \{-1, n-1\}$ .

...

## 9 Stabilité

RAPPEL:

Un sous-espace vectoriel  $F$  de  $E$  est stable par un endomorphisme  $u : E \rightarrow E$  si et seulement si

$$\forall \vec{x} \in E, \vec{x} \in F \implies u(\vec{x}) \in F \quad \text{i.e.} \quad u(F) \subset F.$$

Alors,  $u|_F$  est l'endomorphisme induit par  $u$  sur  $F$ , ceci est parfois noté  $u|_F^F : F \rightarrow F$ .

PROPOSITION 35:

Soit  $E$  un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel. Soit  $\vec{a} \in E$  non nul, et  $u : E \rightarrow E$  un endomorphisme.

Si la droite  $\text{Vect}(\vec{a})$  est stable par l'endomorphisme  $u$  alors il existe  $\lambda \in \mathbb{K}$  tel que  $u(\vec{a}) = \lambda\vec{a}$ , et donc  $\vec{a}$  est un vecteur propre de  $u$ .

Réciproquement, si  $\vec{a}$  est un vecteur propre de  $u$ , alors il existe  $\lambda \in \mathbb{K}$  tel que  $u(\vec{a}) = \lambda\vec{a}$ .

DÉMONSTRATION:

Soit  $\vec{x} \in \text{Vect}(\vec{a})$ . Ainsi, il existe  $\alpha \in \mathbb{K}$  tel que  $\vec{x} = \alpha\vec{a}$ . D'où  $u(\vec{x}) = u(\alpha\vec{a}) = \alpha u(\vec{a}) = \alpha\lambda\vec{a}$  par hypothèse. D'où  $u(\vec{x}) \in \text{Vect}(\vec{a})$  et donc  $\text{Vect}(\vec{a})$  est stable par  $u$ .

EXERCICE 36 (Tarte à la crème):

Soit  $E$  un  $\mathbb{R}$ -espace vectoriel de dimension finie, et  $u : E \rightarrow E$  un endomorphisme. Montrons qu'il existe une droite ou un plan stable par  $u$ .

On utilise le théorème de CAYLEY et HAMILTON (valable en dimension finie). Soit  $A = [u]_{\mathcal{B}}$ , où  $\mathcal{B}$  est une base de l'espace vectoriel. Alors,  $\chi_A(A) = 0$ . On le « casse en petits bouts » :

$$\chi_A(X) = (X - \lambda_1)^{m_1} \cdots (X - \lambda_r)^{m_r} (X^2 + b_1X + c_1)^{n_1} \cdots (X^2 + b_sX + c_s)^{n_s}.$$

Le produit  $\chi_A(A)$  est un produit de matrices, ce produit est la matrice nulle, d'où ce produit n'est pas inversible, d'où l'un des facteurs n'est pas inversible.

- Ou bien, ce facteur est la forme  $(A - \lambda_i I_n)$ , et donc il existe  $X \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$  non nul tel que  $(A - \lambda_i I_n) \cdot X = 0$ . Alors  $A \cdot X = \lambda_i X$  et  $X \neq 0$ . D'où la droite dirigée par ce vecteur  $\text{Vect}(X)$  est stable.
- Ou bien, ce facteur est la forme  $(X^2 + b_i X + c_i I_n)$ , et donc il existe  $X \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$  non nul tel que  $X^2 + b_i X + c_i I_n = 0$ . Autrement dit, il existe un vecteur  $\vec{x} \in E$  non nul, tel que  $u^2(\vec{x}) + b_i u(\vec{x}) + c_i \vec{x} = \vec{0}$ . D'où les vecteurs  $\vec{x}$  et  $u(\vec{x})$  sont libres, et le plan  $\text{Vect}(\vec{x}, u(\vec{x}))$  est stable par  $u$ . En effet,  $u(\vec{x}) \in \text{Vect}(\vec{x}, u(\vec{x}))$ , et  $u(u(\vec{x})) = -b_i u(\vec{x}) - c_i \vec{x} \in \text{Vect}(\vec{x}, u(\vec{x}))$ .

RAPPEL:

Au chapitre II. on a montré que, si deux endomorphismes  $u$  et  $v$  commutent, alors  $\text{Ker } u$  et  $\text{Im } u$  sont stables par  $v$ .

PROPOSITION 37:

Soient  $u$  et  $v$  deux endomorphisme d'un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel  $E$ . Si  $u$  et  $v$  commutent ( $u \circ v = v \circ u$ ), alors les sous-espaces propres de  $u$  sont stables par  $v$ .

DÉMONSTRATION:

Or,  $\text{SEP}_u(\lambda) = \text{Ker}(\lambda \text{id} - u)$ , et, si  $u \circ v = v \circ u$ , alors  $(\lambda \text{id} - u) \circ v = v \circ (\lambda \text{id} - u)$ . D'où  $\text{Ker}(\lambda \text{id} - u)$  est stable par  $v$ . Donc, si deux endomorphismes  $u$  et  $v$  commutent, alors les SEP de l'un sont stables par l'autre.

RAPPEL (proposition 30):

Si  $\chi_A$  est scindé, alors  $E = \bigoplus_{\lambda \in \text{Sp}(A)} C_\lambda$  où  $C_\lambda = \text{Ker}(\lambda I_n - A)^{m_\lambda}$  et  $\forall \lambda \in \text{Sp}(A)$ ,  $\dim C_\lambda = m_\lambda$ .

EXERCICE 38 (re-démonstration de la partie jaune (démonstration fautive dans le poly)):

On choisit une base de  $E : \mathcal{B}(\vec{\varepsilon}_1^1, \dots, \vec{\varepsilon}_{d_1}^1, \vec{\varepsilon}_1^2, \dots, \vec{\varepsilon}_{d_2}^2, \dots, \vec{\varepsilon}_1^r, \dots, \vec{\varepsilon}_{d_r}^r)$ , telle que  $\mathcal{B}_i = (\vec{\varepsilon}_1^i, \dots, \vec{\varepsilon}_{d_i}^i)$

1. En effet, si  $u(\vec{x})$  et  $\vec{x}$  sont liés, alors il existe  $k \in \mathbb{R}$  tel que  $u(\vec{x}) = k\vec{x}$ , et donc le facteur dans l'expression de  $\chi_A(X)$  est donc  $(X - k)$ .

soit une base de  $C_{\lambda_i}$ , où  $d_i = \dim C_{\lambda_i}$ . Soit  $u$  l'endomorphisme représenté par la matrice  $A$  dans la base  $\mathcal{B}$ . Ainsi,

$$[u]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} B_1 & & & \\ & B_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & B_r \end{pmatrix}$$

car chaque sous-espace caractéristique  $C_{\lambda_i}$  est stable par  $u$ . Or,  $A$  commute avec  $(\lambda_i I_n - A)^{m_{\lambda_i}}$ . D'où  $\text{Ker}(\lambda_i I_n - A)^{m_{\lambda_i}} = C_{\lambda_i}$  est stable par  $A$ . De plus, la taille du bloc  $B_i$  est égal à la  $d_i = \dim C_{\lambda_i}$ . On veut montrer que, pour tout  $i$ ,  $d_i = m_{\lambda_i}$ . On sait que  $B_i = [u|_{C_{\lambda_i}}]_{\mathcal{B}_i}$ . Or,  $C_{\lambda_i} = \text{Ker}((\lambda_i \text{id} - u)^{m_{\lambda_i}})$ , d'où  $\forall \vec{x} \in C_{\lambda_i}$ ,  $(\lambda_i \text{id} - u|_{C_{\lambda_i}})^{m_{\lambda_i}}(\vec{x}) = \vec{0}$ . D'où  $\lambda_i \text{id} - u|_{C_{\lambda_i}}$  est nilpotent. D'où, le polynôme caractéristique  $\chi_{\lambda_i \text{id} - u|_{C_{\lambda_i}}} = X^{d_i}$ . Or, le polynôme caractéristique d'une restriction d'un endomorphisme divise le polynôme caractéristique de cet endomorphisme. D'où  $\forall i$ ,  $d_i \leq m_{\lambda_i}$ . Or,  $\sum_{i=1}^r d_i = n$ , où  $n = \dim E$ , et  $\sum_{i=1}^r m_{\lambda_i} = n$ . D'où,  $\forall i$ ,  $d_i = m_{\lambda_i}$ . Enfin,  $B_i = [u|_{C_{\lambda_i}}]_{\mathcal{B}_i}$ . Or,  $(u|_{C_{\lambda_i}} - \lambda_i \text{id})^{m_{\lambda_i}} = 0$ . D'où  $u|_{C_{\lambda_i}} = \lambda_i \text{id} + (u|_{C_{\lambda_i}} - \lambda_i \text{id})$ , et donc  $B_i = \lambda_i I_{d_i} + N_i$  où  $N_i$  est une matrice nilpotente.

**PROPOSITION 39:**

Soient  $E$  un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie, et  $u : E \rightarrow E$  un endomorphisme de  $E$ . Soit  $F$  un sous-espace vectoriel de  $E$  stable par  $u$ . On définit

$$v = u|_F : F \rightarrow F \\ \vec{x} \mapsto u(\vec{x}).$$

Alors  $\chi_v \mid \chi_u$  (i.e.  $\chi_u$  est un multiple de  $\chi_v$ ).

**DÉMONSTRATION:**

Soit  $A = [u]_{\mathcal{B}}$  où  $\mathcal{B}$  est une base de  $E$ . Soient  $F$  et  $G$  deux supplémentaires de  $E$ . Soit  $(\vec{e}_1, \dots, \vec{e}_d)$  une base de  $F$ . En complétant cette base de  $F$  en une base  $(\vec{e}_1, \dots, \vec{e}_d, \vec{e}_{d+1}, \dots, \vec{e}_n)$  de  $E$ . Il existe une matrice inversible  $P$  telle que

$$P^{-1} \cdot A \cdot P = \left( \begin{array}{c|c} C & * \\ \hline 0 & D \end{array} \right).$$

Le bloc  $C$  est la matrice de  $v$  dans la base  $(\vec{e}_1, \dots, \vec{e}_d)$ . Or,

$$\chi_A(x) = \det(xI_n - A) = \det \left( \begin{array}{c|c} xI - C & -* \\ \hline 0 & xI - D \end{array} \right) = \underbrace{\det(xI - C)}_{\chi_C} \times \underbrace{\det(xI - D)}_{\chi_D}$$

car ce déterminant est triangulaire par blocs. D'où  $\chi_A = \chi_C \times \chi_D$ , et donc  $\chi_C \mid \chi_A$  i.e.  $\chi_v = \chi_u$ .

**PROPOSITION 40:**

Soit  $E$  un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie, et soit  $u : E \rightarrow E$  un endomorphisme.

Si  $u$  est diagonalisable, et  $F$  est un sous-espace vectoriel stable par  $u$ , alors  $u|_F$  est aussi diagonalisable.

**DÉMONSTRATION:**

On suppose  $u$  diagonalisable. D'où  $u$  possède un polynôme annulateur  $P$  scindé à racine simple. Alors  $P(u) = 0_{\mathcal{L}(E)}$ , d'où  $\forall \vec{x} \in E$ ,  $P(u)(\vec{x}) = \vec{0}_E$ , et donc  $\forall \vec{x} \in F$ ,  $P(u|_F)(\vec{x}) = \vec{0}_E = \vec{0}_F$ . Et donc, le polynôme  $P$  est annulateur de  $u|_F$  et il est scindé à racines simples. D'où  $u|_F$  est diagonalisable.

**EXERCICE 41:**

Soit  $A$  une matrice diagonale par blocs. Montrer que  $A$  est diagonalisable si et seulement si

chaque bloc est diagonalisable.

$$\left[ \begin{array}{c|c|c|c} B_1 & 0 & 0 & 0 \\ \hline 0 & B_2 & 0 & 0 \\ \hline 0 & 0 & \ddots & 0 \\ \hline 0 & 0 & 0 & B_r \end{array} \right] \begin{array}{l} \varepsilon_1 \\ \vdots \\ \varepsilon_{d_1} \\ \varepsilon_{d_1+1} \\ \vdots \\ \varepsilon_{d_1+d_2} \\ \vdots \\ \varepsilon_{d_1+\dots+d_{r-1}+1} \\ \vdots \\ \varepsilon_{d_1+\dots+d_r} \end{array}$$

“ $\Leftarrow$ ” Soit  $u$  l'endomorphisme tel que  $[u]_{\mathcal{B}} = A$ , où  $\mathcal{B} = (\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_d, \dots, \varepsilon_{d_1+\dots+d_{r-1}+1}, \dots, \varepsilon_{d_1+\dots+d_r})$ . Chaque sous-espace vectoriel  $F_i$  est stable par  $u$  car la matrice est diagonale par blocs. Or, chaque bloc est diagonalisable, d'où chaque  $u|_{F_i}$  est diagonalisable. Il existe donc une base de  $F_i$  formée de vecteurs propres de  $u$ . En concaténant ces bases, on obtient une base de  $F$  formée de vecteurs propres de  $u$ .  
Autre méthode : Chaque bloc  $B_i$  est diagonalisable, d'où  $\forall i, \exists P_i \in \text{GL}_{d_i}(\mathbb{K}), P_i^{-1} \cdot B_i \cdot P_i = D_i$  diagonale. On pose

$$P = \left( \begin{array}{c|c|c|c} P_1 & 0 & \dots & 0 \\ \hline 0 & P_2 & \ddots & \vdots \\ \hline \vdots & \ddots & \ddots & 0 \\ \hline 0 & \dots & 0 & P_r \end{array} \right).$$

Et donc

$$P^{-1} \cdot A \cdot P = \left( \begin{array}{c|c|c|c} D_1 & 0 & \dots & 0 \\ \hline 0 & D_2 & \ddots & \vdots \\ \hline \vdots & \ddots & \ddots & 0 \\ \hline 0 & \dots & 0 & D_r \end{array} \right).$$

“ $\Rightarrow$ ” Réciproquement, pour tout  $i$ , on a  $B_i = [u|_{F_i}]_{(\varepsilon_{d_1+\dots+d_{i-1}+1}, \dots, \varepsilon_{d_1+\dots+d_i})}$ .

Or  $u$  est diagonalisable, donc tout endomorphisme induit par  $u$  sur un sous-espace vectoriel stable est diagonalisable. Et donc, chaque bloc est diagonalisable.



## Deuxième partie

## T.D.

## Exercice ? : Matrice compagnon

On considère la matrice

$$A = \begin{pmatrix} 0 & \dots & \dots & 0 & -a_0 \\ 1 & & & & -a_1 \\ 0 & & & & \vdots \\ \vdots & & & & \vdots \\ 0 & \dots & 0 & 1 & 0 \\ 0 & \dots & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Ainsi, dans un système d'équation différentielles, on a

$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} x'_0(t) \\ x'_1(t) \\ \vdots \\ x'_p(t) \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} 0 & \dots & \dots & 0 & -a_0 \\ 1 & & & & -a_1 \\ 0 & & & & \vdots \\ \vdots & & & & \vdots \\ 0 & \dots & 0 & 1 & 0 \\ 0 & \dots & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}^\top \begin{pmatrix} x_0(t) \\ x_1(t) \\ \vdots \\ x_p(t) \end{pmatrix} \\ \Leftrightarrow \begin{pmatrix} x'_0(t) \\ x'_1(t) \\ \vdots \\ x'_p(t) \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & 0 \\ 0 & \dots & 0 & 1 & 0 \\ -a_0 & -a_1 & \dots & -a_{p-1} & -a_p \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_0(t) \\ x_1(t) \\ \vdots \\ x_p(t) \end{pmatrix} \\ \Leftrightarrow \begin{cases} x'_0(t) = x_1(t) \\ x'_1(t) = x_2(t) \\ \vdots \\ x'_{p-1}(t) = x_p \\ x'_p(t) = -a_0x_0(t) - a_1x_1(t) - \dots - a_px_p(t) \end{cases} \\ \rightsquigarrow \begin{cases} \boxed{\text{Notations}} \\ x^{(p+1)}(t) + a_0x(t) + a_1x'(t) + \dots + a_px^{(p)}(t) = 0 \end{cases} \end{aligned}$$

La dernière ligne du système est un équation différentielle d'ordre  $p + 1$ .

Calculons  $\det(xI_{p+1} - A)$ . On note

$$D_i = \begin{vmatrix} x & 0 & \dots & \dots & a_i \\ -1 & \ddots & \ddots & & a_{i+1} \\ 0 & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \dots & 0 & -1 & x + a_p \end{vmatrix}.$$

D'où  $D_0 = xD_1 + a_0$ ,  $D_1 = xD_2 + a_1$ , et donc

$$\begin{aligned}
 D_0 &= x(xD_2 + a_1) + a_0 \\
 &= xD_2 + xa_1 + a_0 \\
 &= \dots \\
 &= x^{p-1}D_{p-1} + \sum_{k=0}^{p-2} x^k a_k \\
 &= x^{p-1}(x(x + a_p) + a_{p-1}) + \sum_{k=0}^{p-2} x^k a_k \\
 &= \sum_{k=0}^p x^k a_k + x^{p+1}
 \end{aligned}$$

Autre méthode :

$$\det(xI_{p+1} - A) = \begin{vmatrix} x & 0 & \dots & 0 & a_i \\ -1 & \ddots & \ddots & \vdots & a_0 \\ 0 & \ddots & \ddots & 0 & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & x & a_{p-1} \\ 0 & \dots & 0 & -1 & x + a_p \end{vmatrix} \begin{array}{l} \leftarrow L_0 + xL_1 + \dots + x^p L_p \\ \leftarrow L_1 \\ \vdots \\ \vdots \\ \leftarrow L_p \end{array}$$

## Exercice 9

On considère la matrice

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 2 & 3 & -4 \\ 4 & 1 & -4 \end{pmatrix}.$$

Soit  $\lambda \in \mathbb{R}$ . On sait que

$$\lambda \in \text{Sp}(A) \iff \det(\lambda I_3 - A) = 0.$$

On calcule  $\det(\lambda I_3 - A)$  :

$$\begin{aligned}
 \det(\lambda I_3 - A) &= \begin{vmatrix} \lambda - 1 & -1 & 1 \\ -2 & \lambda - 3 & 4 \\ -4 & -1 & \lambda + 4 \end{vmatrix} \\
 &= \begin{vmatrix} \lambda - 1 & -1 & 1 \\ \lambda - 1 & \lambda - 3 & 4 \\ \lambda - 1 & -1 & \lambda + 4 \end{vmatrix} \text{ avec le changement } C_1 \leftarrow C_1 + C_2 + C_3 \\
 &= (\lambda - 1) \begin{vmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 1 & \lambda - 3 & 4 \\ 1 & -1 & \lambda + 4 \end{vmatrix} \\
 &= (\lambda - 1) \begin{vmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & \lambda - 2 & 3 \\ 0 & 0 & \lambda - 3 \end{vmatrix} \text{ avec les changements } \begin{cases} L_2 \leftarrow L_2 - L_1 \\ L_3 \leftarrow L_3 - L_1 \end{cases} \\
 &= (\lambda - 1)(\lambda - 2)(\lambda + 3).
 \end{aligned}$$

D'où  $\text{Sp}(A) = \{1, 2, -3\}$ , et

$$1 \leq \dim(\text{SEP}(1)) \leq 1 \quad 1 \leq \dim(\text{SEP}(2)) \leq 1 \quad \text{et} \quad 1 \leq \dim(\text{SEP}(-3)) \leq 1.^2$$

2. inutile dans ce cas

La matrice  $A$  est de taille 3 et elle possède 3 valeurs propres distinctes deux à deux. D'où, d'après la proposition 18, on sait donc que  $A$  est diagonalisable. Diagonalisons-la.

### Exercice 8

1. Soit un vecteur non nul  $\vec{x} \in \text{Ker}(\text{id} - u \circ v)$ . Ainsi,  $u(v(\vec{x})) = \lambda \vec{x}$ . Et, donc  $v(u(v(\vec{x}))) = \lambda v(\vec{x})$ . On a donc  $v(\vec{x}) \in \text{Ker}(\lambda \text{id} - v \circ u)$ . Or, si  $\lambda \neq 0$ , on a  $v(\vec{x}) \neq \vec{0}$ ; en effet, si  $v(\vec{x}) = \vec{0}$ , alors  $u \circ v(\vec{x}) = \vec{0} = \lambda \vec{x}$  et donc  $\vec{x} = \vec{0}$ , ce ne serait donc pas un vecteur propre de  $u \circ v$  : une contradiction. On en déduit que  $v(\vec{x})$  est un vecteur propre de  $u \circ v$  associé à la valeur propre  $\lambda$ .
2. On pose donc  $\lambda = 0$ , une valeur propre de  $u \circ v$ . L'endomorphisme  $u \circ v$  n'est donc pas injectif, donc bijectif. On sait donc, comme  $E$  est de dimension finie, que  $\det(u \circ v) = 0$ . Or  $\det(u \circ v) = \det u \times \det v = \det(v \circ u)$ . Et donc  $\det(v \circ u) = 0$ ,  $v \circ u$  n'est donc pas bijectif, donc injectif. Et donc, on a  $0 \in \text{Sp}(v \circ u)$ .
3. Soit  $P \in \mathbb{R}[X]$ , et soit  $Q$  une primitive de  $P$ .

$$\begin{aligned} P \in \text{Ker}(u \circ v) &\iff \left( \int_0^X P(t) dt \right)' = 0 \\ &\iff (Q(X) - Q(0))' = 0 \\ &\iff Q'(X) = 0 \\ &\iff P(X) = 0 \end{aligned}$$

On en déduit que  $\text{Ker}(u \circ v) = \{0\}$ .

Également,

$$\begin{aligned} P \in \text{Ker}(v \circ u) &\iff \int_0^X P'(t) dt = 0 \\ &\iff P(X) - P(0) = 0 \\ &\iff P(X) = P(0) \\ &\iff \deg P \leq 0 \\ &\iff P \in \mathbb{R}_0[X] \end{aligned}$$

On en déduit que  $\text{Ker}(v \circ u) = \mathbb{R}_0[X]$ .

### Exercice 6

Soient  $a, b$  et  $c$  trois réels. Soient  $A$  et  $B$  deux matrices  $3 \times 3$ , définies par

$$A = \begin{pmatrix} 1 & a & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & a \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad \begin{pmatrix} 2 & b & 0 \\ 0 & c & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

Pour quelles valeurs des réels  $a, b$  et  $c$  les matrices  $A$  et  $B$  sont-elles diagonalisables ?

Soit  $\lambda \in \mathbb{R}$ . D'où

$$\lambda \in \text{Sp}(A) \iff \det(\lambda I_3 - A) = 0$$

Or,

$$\det(\lambda I_3 - A) = \begin{vmatrix} \lambda - 1 & -a & -1 \\ 0 & \lambda - 1 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda - a \end{vmatrix} = (\lambda - 1)^2 \cdot (\lambda - a)$$

<sup>1ER</sup> CAS  $a = 1$  : on a donc  $\text{Sp}(A) = \{1\}$ . Par l'absurde, si  $A$  est diagonalisable, alors  $A \sim I_3$ , d'où  $A = I_3$ , ce qui est absurde. Et donc  $A$  n'est pas diagonalisable.

2<sup>ND</sup> CAS  $a \neq 1$  : on a donc  $\text{Sp}(A) = \{1, a\}$ . D'où  $1 \leq \dim(\text{SEP}(a)) \leq 1$ , et  $1 \leq \dim(\text{SEP}(1)) \leq 2$ . Or, la matrice  $A$  est diagonalisable si et seulement si  $\dim(\text{SEP}(a)) + \dim(\text{SEP}(1)) = 3$ , donc si et seulement si  $\dim(\text{SEP}(1)) = 2$ . Soit donc  $X = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{3,1}(\mathbb{R})$ .

$$\begin{aligned} X \in \text{SEP}(1) &\iff AX = X \\ &\iff \begin{pmatrix} 1 & a & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & a \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \\ &\iff \begin{cases} ay + z = 0 \\ az = z \end{cases} \\ &\iff \begin{cases} ay = 0 \\ z = 0 \end{cases} \quad \text{car } a \neq 1 \end{aligned}$$

1<sup>er</sup> sous-cas  $a = 0$  :

$$X \in \text{SEP}(1) \iff z = 0 \iff X = x \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + y \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

D'où  $\dim(\text{SEP}(1)) = 2$ .

2<sup>nd</sup> sous-cas  $a \neq 0$  :

$$X \in \text{SEP}(1) \iff \begin{cases} y = 0 \\ z = 0 \end{cases} \iff X = x \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

D'où  $\dim(\text{SEP}(1)) = 1$ .

Ainsi,  $A$  est diagonalisable si et seulement si  $a = 0$ .

## Exercice 15

" $\implies$ " On suppose  $A$  et  $B$  diagonalisables. On suppose aussi  $AB = BA$ . Ainsi, il existe une matrice inversible  $P \in \text{GL}_n(\mathbb{K})$  telle que  $P^{-1} \cdot A \cdot P = A'$  diagonale. Soit  $B' = P^{-1} \cdot P \cdot B$ . Également, on sait que les sous-espaces propres de  $A$  sont stables par  $B$ . Ainsi,

$$A' = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & & & \\ & \ddots & & & \\ & & \lambda_1 & & \\ \hline & & & \ddots & \\ & & & & \ddots \\ \hline & & & & & \lambda_r & \\ & & & & & & \ddots \\ & & & & & & & \lambda_r \end{pmatrix} \quad \text{et } B' = \begin{pmatrix} B_1 & & \\ \hline & \ddots & \\ \hline & & B_r \end{pmatrix}.$$

$B'$  est diagonalisable car  $B$  est diagonalisable. Mieux : chaque bloc de  $B'$  est diagonalisable d'après le théorème 40. On diagonalise le bloc  $B_1$  en  $B_1''$  en passant dans une nouvelle base  $(\vec{e}_1', \dots, \vec{e}_{d_1}')$  de  $\text{SEP}_A(\lambda_1)$ . Alors  $B_1''$  est diagonal. De même,  $B_2'', \dots, B_r''$  sont des blocs diagonaux. Or, la matrice  $A'$  est restée diagonale car les vecteurs  $(\vec{e}_1', \dots, \vec{e}_{d_1}')$  sont dans  $\text{SEP}_A(\lambda_1)$ . Et, de même pour les autres blocs.

## Exercice 10

1.

ANALYSE On suppose qu'il existe  $P$  une matrice inversible telle que  $P^{-1} \cdot A \cdot P = \begin{pmatrix} a & 1 \\ 0 & b \end{pmatrix} = T$ .

*1ère méthode* On a  $\text{tr } A = 2 = a + b = \text{tr } T$ , et  $\det A = 1 = a \times b = \det T$ . D'où  $a$  et  $b$  sont solutions de l'équation  $X^2 - 2X - 1 = 0$ , i.e.  $(X - 1)^2 = 0$ . D'où  $a = b = 1$ .

*2nde méthode* On a  $\chi_A(X) = \begin{vmatrix} X & -1 \\ 1 & X-2 \end{vmatrix} = (X - 1)^2 = (X - a)(X - b) = \chi_T(X)$ . D'où  $a = b = 1$ .

